

10

lucruri pe care trebuie
să le știi despre
**vaccinarea împotriva
COVID-19** cu
**vaccinul bivalent
adaptat pentru variantele
Omicron BA.4-BA.5**



1. Cine se poate vaccina cu vaccinul bivalent Covid 19?

Se recomandă tuturor persoanelor cu vârstă de 12 ani și peste, pentru care au trecut mai mult de trei luni de la administrarea ultimei doze de vaccin din schema primară sau de la administrarea oricărei doze de rapel (booster).

Vaccinul bivalent Covid 19 nu se administrează persoanelor care nu au fost anterior vaccinate împotriva COVID-19.

2. De ce este recomandat vaccinul bivalent Covid 19?

Vaccinul reprezintă o versiune adaptată pentru tulpinile de SARS-CoV-2 Omicron BA4.4 și BA.5 aflate în circulație în acest sezon, crescând protecția împotriva infecțiilor, a formelor grave de boală și spitalizării ulterioare.

3. Când te poți vaccina cu vaccinul bivalent Covid 19?

După 3 luni de la finalizarea unei scheme de vaccinare complete împotriva COVID-19 sau de la administrarea oricărei doze de rapel (booster).

Vaccinul bivalent Covid 19 se poate administra concomitent sau la orice distanță de timp cu alt produs din Programul Național de Vaccinare, inclusiv vaccinul gripal.

Persoanele care au fost expuse la SARS-CoV-2 pot fi vaccinate după ce s-au vindecat sau dacă nu prezintă simptome compatibile cu infecția cu SARS-CoV-2.

4. Unde te poți vaccina cu vaccinul bivalent Covid 19?

Te poți adresa medicului de familie sau poți accesa lista centrelor de vaccinare aici (<https://insp.gov.ro/lista-nationala-centre-vaccinare-covid-19/>).

Poți să alegi centrul care este convenabil pentru tine.

5. Ce fel de vaccin este vaccinul bivalent Covid 19?

Este un vaccin tip ARNm COVID-19, adaptat pentru a oferi o protecție mai largă, pentru subvariantele Omicron BA.4 și BA.5

6. Cum se administrează vaccinul bivalent Covid 19?

Vaccinul se administrează intramuscular, preferabil în regiunea superioară a brațului, la nivelul mușchiului deltoid.

7. Ce reacții adverse sunt posibile după vaccinarea cu vaccinul bivalent Covid 19?

Cele mai frecvente reacții adverse sunt durere și edem la locul injectării, oboseală, cefalee, frison, febră, dureri articulare și diaree. Aceste posibile reacții adverse afectează mai mult de o persoană din zece.

Mai rare sunt roșeața la locul injectării, greață, vărsături.

Foarte rare sunt adenopatia, starea generală alterată, durerea la nivelul unui membru, insomnia, pruritul la locul administrării ori transpirațiile nocturne.

8. Ce trebuie să faci dacă apare o reacție adversă după vaccinarea cu vaccinul bivalent Covid 19?

La momentul vaccinării, persoanele primesc un număr de telefon unde pot să se adreseze în cazul apariției unei reacții adverse postvaccinale, pentru ca aceasta să fie investigată și raportată.

Însă, raportarea se poate face și individual, pe site-ul ANMDMR <https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/farmacovigilenta/raporteaza-o-reactieadversa/> prin fișele de raportare ANMDMR sau pe mail la adr@anm.ro.

Toate reacțiile postvaccinale severe vor fi investigate.

9. Te poți vaccina cu vaccinul bivalent Covid 19 dacă ești însărcinată sau alăptezi?

Pe baza datelor disponibile referitoare la alte variante de vaccin, vaccinul bivalent poate fi utilizat în timpul sarcinii.

10. Cum să procedezi pentru a beneficia de vaccin?

1. Identifică pe website-ul Institutului Național de Sănătate Publică centrul de vaccinare potrivit nevoilor tale (<https://insp.gov.ro/informatii-privind-vaccinarea-cu-boosterul-bivalent-covid-19/>).
2. Mergi la centrul de vaccinare ales din lista centrelor disponibile.
3. La centrul de vaccinare vei completa un chestionar în vederea triajului pentru vaccinare.
4. Medicul va verifica dacă ești eligibil pentru vaccinare, iar în cazul în care îți vei da acordul informat, vei beneficia de vaccinare. Acordul este necesar și în cazul părinților copiilor cu vârsta de 12 ani și peste care vin la vaccinare.